

Алгоритм деэскалации дозы антигистаминного препарата второго поколения

Хроническая спонтанная крапивница, хроническая индуцированная крапивница (неконтролируемое течение)

Стандартная доза антигистаминного препарата

Оценка эффективности в течение 1-й недели или ранее*

Продолжить терапию

UAS-7 снизился ≥ 30%

Пациенты с длительным анамнезом/ неконтролируемым тяжелым течением

Неэффективность терапии

Повышение дозы в 2 раза

Оценка через 1 неделю

Продолжить терапию

UAS-7 снизился ≥ 30%

Неэффективность терапии

Повышение дозы в 3 раза

Оценка через 1 неделю

Продолжить терапию

UAS-7 снизился ≥ 30%

Повышение дозы в 4 раза

Оценка через 1 неделю

Продолжить терапию

UAS-7 снизился ≥ 30%

Смена тактики ведения

* через 1–3 дня при агрессивном течении болезни.

Алгоритм деэскалации дозы антигистаминного препарата второго поколения

Эффективная доза антигистаминного препарата (2-, 3-, 4-кратное увеличение). Полный контроль над заболеванием в течение 2–4 недель



Примечание. Условием выбора пути деэскалации дозы является наличие длительного анамнеза заболевания/неэффективность предыдущего лечения.

Кратная доза нсH1-АГП делится на два приема в течение дня – утром и вечером.